



Instrucciones para Descarga de Drenaje Percutáneo

¿Qué es un drenaje percutáneo guiado por imagen?

El emplazamiento de un drenaje percutáneo es un procedimiento hecho por un radiólogo para sacar o drenar liquido de alguna parte de su cuerpo.

El drenaje se coloca usando un "CT Scan" o una máquina de ecografía que ayuda al radiólogo llegar a la parte del cuerpo donde el liquido se ha alojado.

Durante el procedimiento el radiólogo inserta un catéter de drenaje, el cual es un tubo estrecho, a través de la piel y continua hasta llegar a la arte deseada. Este catéter habilita que el liquido acumulado salga y descargue en la bolsa de drenaje.

A veces, el drenaje debe permanecer en su sitio por semanas o inclusive meses. Una vez la descarga de liquido se haya reducido a casi nada el drenaje se podrá sacar.

Instrucciones para su cuidado posterior al procedimiento

- Continúe sus labores normalmente, siempre lo tolere.
- Es posible que el lugar del drenaje le duela por un par de días. Puede tomar medicamentos para el dolor sin receta, como acetaminophen (Tylenol) o ibuprophen (Advil o Motrin), para aliviarse. Si su medico sospecha o espera que su dolor pueda ser mas fuerte, se le podría recetar un analgésico mas potente. Nos puede llamar si los medicamentos que esta tomando no le alivian el dolor.
- Se puede duchar a las 24 horas después del procedimiento.

Cuidado del drenaje

- Proteja el tubo de drenaje para que no se salga de su sitio.
- Asegúrese de **lavarse las manos** muy bien antes y después de tocar el drenaje o vaciar la bolsa de liquido.
- Cada vez que vacíe la bolsa de drenaje, apunte la cantidad de liquido siguiendo las marcas de volumen en la bolsa. Mantenga una libreta para este propósito y apunte su volumen de liquido drenado todos los días. Cuando venga a sus visitas de evaluación, traiga su libreta.
- Si el volumen de liquido drenado es inferior a 10 ml por día, por mas de 2 o 3 días corridos, comuníquese con nosotros. Es posible que ya se le pueda sacar el drenaje.
- Algunos drenajes necesitan que se enjuaguen diariamente para evitar que se tapen. Su medico le dirá si el suyo lo necesita y cuan frecuentemente debe hacerlo.
- Si su drenaje tiene una llave (o válvula) de tres vías, puede enjuagar su drenaje sin necesidad de sacar la bolsa. Acuérdesse que la posición de 'cerrada' apunta hacia la vía que está cerrada.

Cuidado del vendaje

- Mantenga su vendaje limpio y seco. Asegúrese de **lavarse las manos** muy bien antes y después de cambiarse el vendaje.

- Se puede duchar (después de 24 horas), pero mantenga su drenaje cubierto con plástico y cinta adhesiva (Glad Press 'N' Seal es la que mejor nos funciona). No se siente en la bañera ni se meta en un baño caliente ni nade. Le podría entrar agua al drenaje y provocar una infección.
- Para reducir el riesgo de infección, debería cambiarse el vendaje que cubre su drenaje una vez a la semana.
- Si observa que el vendaje tiene mucha sangre o liquido, debería cambiarse el vendaje.
- Cuando salga de Teton Radiology, se le dará solución de enjuagado y vendas, pero es posible que tenga que comprar más en la farmacia que desee.

Por favor llame al doctor que pidió este examen o a su medico de familia si nota cualquiera de los síntomas siguientes:

- Dolor fuerte en el sitio que no se alivia con Tylenol
- Hematoma o bulto doloroso alrededor de la biopsia
- Fiebre de más de 100.6°F
- Enrojecimiento o drenaje en el sitio de la biopsia
- Nausea o vómito continuo

Busque cuidado de urgencias si tiene:

- Dolor de pecho
- Sangrado continuo
- Confusión u otro cambio en su estado mental
- Dificultad respirando o falta de aliento
- Hinchazón progresiva en cualquier área del cuerpo
- Dolor abdominal fuerte o sentido de vientre hinchado
- Mareo o sensación de que va a perder el conocimiento

Si tiene una emergencia, vaya directamente a la sala de urgencias más cercana. No espere a que nuestra oficina se comunique con usted.

Para comunicarse con Teton Radiology por favor llame al 208-524-7237 en Idaho Falls, o al 208-356-4888 en Rexburg

(Nombre del paciente – favor de usar letra de imprenta)

Su radiólogo fue:

Yo entiendo la información aquí dada

(Firma del paciente o miembro de familia)

Fecha

Revisado conmigo por:

(Enfermera/o, [nurse])

Fecha (date)